

患者提问：1. 化疗会发生转移吗？病人在肿瘤缩小的情况下，会发生转移吗？

周彩存教授回答：化疗在没有有效的情况下，肿瘤会发生转移。大多数的病人化疗效果比较好，肿瘤不会转移，但是 20% 的病人化疗后肿瘤还会长，也就是化疗没有有效的病人，没有有效的病人化疗是会发生转移的。

2. 患者化疗后肿瘤小了还会发生转移吗？

周彩存教授回答：这种可能性会有，绝大部分病人，在肿瘤缩小的同时，其他部分的肿瘤往往跟着缩小。

但是有少部分病人，肺部肿瘤小了，其他部位肿瘤不缩小。出现新的转移灶，这种情况下也判断为化疗没有效。

3. 肺癌治疗中什么时段看中医为适宜？

周彩存教授回答：中医中药对肿瘤有一点疗效，但是发挥作用是有限的。我觉得，中医跟化疗配合在一起，我们主要看中中医缓解化疗的不良反应，化疗的胃肠道反应，化疗的疲乏等。从这个角度上讲中医可以和化疗配合使用，但是一定要注意，你使用的中药不能影响到病人的肝功能及肾功能。同样中药不能影响病人的胃口，化疗后病人可能会胃口不好，这种情况下中药不会起帮助反而会产生不好的效果。化疗跟中医药同时用时，主要看中药对化疗的毒副反应是否能够有所缓解。化疗结束后假如患者不愿意做维持治疗，那么我认为吃中药对患者没有坏处，可以增强抵抗力。究竟是同时用，还是化疗结束后用，主要看目的，假如你化疗反应比较大，建议你通过中药缓解，假如化疗反应比较轻，建议化疗结束后吃中药。

4. 化疗疗程有上限吗？

周彩存教授回答：只要病人身体许可就可以一直做下去。化疗是否做的越长效果越好呢，以前的观点是这样的。现在观念不同了，标准的一线化疗，做到 4 个周期可以停下来，最多做到 6 个周期。假如 4-6 个周期以后肿瘤可以控制了，在这种情况下可以做维持治疗。维持治疗可以维持到肿瘤长大为止。

肺癌引起的组织性肺炎，除了化疗以外要不要用抗生素，做抗炎治疗

周彩存教授回答：肺癌引起的阻塞性肺炎，主要是由肿瘤阻塞气道所引起的。假如肿瘤组织一旦改善的情况下，这个阻塞性肺炎自己会好。这种病人主要以肿瘤治疗为主，抗炎治疗根据病人的状况来决定，假如这个病人有发烧，白细胞很高，有明显黄痰，有明显的感染迹象的情况下，我们可以考虑使用抗生素。假如这个病人只有一点热度，白细胞也不是很高，没有感染的迹象的情况下，我们可以不使用抗生素，主要以化学治疗为主。

. 5. 肺癌会引起静脉血管堵塞吗

周彩存教授回答：肺癌会引起血管堵塞，因为纵膈或者锁骨上淋巴结肿大以后可以压迫静脉，可以压迫锁骨上静脉，把血管堵了。肺癌还可以通过形成癌栓把血管堵了，所以肿瘤会引起静脉堵塞。原因有两个，一个直接肿瘤压迫，一个通过形成血栓、癌栓。

怎么治疗呢？主要分析原因，是哪个为主，如果是阻塞为主，那么还是以肿瘤治疗为主。假如是血栓、癌栓引起的，应该通过活血化瘀，抗凝治疗为主，或者取栓来达到目的。

#### 6. 化疗超过 6 个周期，维持治疗有没有上限

周彩存教授回答：维持治疗没有上限，肿瘤长大了就没有效了，就不应该再治了。病人受不了了，出现不良反应，也应该停下来，让病人好好休息。这是两个原则。

#### 7. 请问一下！肺癌已经骨转移咯！还做不做化疗或者放疗啊？现在应该怎样治疗了？谢谢

周彩存教授回答：这个问题是一个很常见的问题。当然要做，晚期的肺癌病人能走能跑，脏器功能好，就应该要做化疗，病人就会受益。放疗要根据病人的情况来决定，假如影响承重骨（脊椎，下肢骨）假如骨头有明显碰坏的话，要做放疗，骨头如果坏了，就永远也恢复不了了。第二点，看骨转移是否引起症状，假如骨转移引起明显的疼痛的话，那应该做止痛治疗。没有疼痛，又不是承重骨，可以用双膦酸盐加化疗的策略治疗。

#### . 8.肺癌的治疗效果

周彩存教授回答：晚期非小细胞肺癌的效果已经有了很明显的改善。现在得了肺癌后存活时间越来越长，比之以前的 1 年，增长到了 2 年 3 年甚至 4 年 5 年。

我们专家正在探讨如何把肺癌变成慢性疾病，这是我们的近期目标。如果是 EGFR 基因突变的病人在化疗以后用靶向药物，活 2-3 年已经不是一种梦了。这个可能成为一种慢性疾病。